

# Impfplan 2008

Österreich  
Kinder und Jugendliche

- Grün:** voll finanziert
- Gelb:** teilweise finanziert
- Rot:** nicht finanziert



Forum Impfschutz

## Allgemein empfohlene Impfungen bis zum 2. Lebensjahr

|  | ab 7. Wo                        | 3. Mon                    | 5. Mon            | 6. Mon | 7. Mon            | 10. Mon               | nach vollendetem 12. Lebensmonat | 2. Jahr   |  |
|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|
| Rotavirus (RTV)  | 2 x bzw. 3 x RTV-Schluckimpfung |                           |                   |        |                   |                       |                                  |   |  |
| 6-fach-Impfung<br>Diphtherie (DIP), Tetanus (TET),<br>Pertussis (PEA), Poliomyelitis (IPV),<br>Haemophilus infl. B (HIB),<br>Hepatitis B (HBV) |                                 | 1. 6-fach-Impfung         | 2. 6-fach-Impfung |        | 3. 6-fach-Impfung |                       |                                  | 4. 6-fach-Impfung   |  |
| Masern, Mumps, Röteln (MMR)  |                                 |                           |                   |        |                   |                       | 1. MMR-Impfung                   | 2. MMR-Impf.<br>(4 Wo. Mindestabstand zur 1. MMR-Impfung) |  |
| Konjugierte Mehrfachimpfung gegen Pneumokokken (PNC)   |                                 | 1. PNC-Impfung            | 2. PNC-Impfung    |        | 3. PNC-Impfung    |                       |                                  | 4. PNC-Impfung  |  |
| FSME   |                                 |                           |                   |        |                   |                       | FSME-Impfung (3 Dosen)           |   |  |
| Hepatitis A  |                                 |                           |                   |        |                   |                       | Hep A- Impfung (2 Dosen)         |   |  |
| Influenza (FLU)  |                                 |                           |                   |        |                   | FLU-Impfung (2 Dosen) |                                  |   |  |
| Meningokokken C  |                                 | Meningokokken C (3 Dosen) |                   |        |                   |                       |                                  | oder Meningokokken C (1 Dosis)                            |  |
| Varizellen (VZV)   |                                 |                           |                   |        |                   | VZV-Impfung (1 Dosis) |                                  |   |  |

## Allgemein empfohlene Impfungen bis zum 17. Lebensjahr

|   | 7.   | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.                              | 14. | 15. | 16. | 17. |
|---|--|----|----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Diphtherie (dip), Tetanus (TET),<br>Poliomyelitis (IPV) | Auffrischungsimpfung dip-TET-IPV *   |    |    |     |     |     |                                  |     |     |     |     |
| Hepatitis B (HBV)                                       | Auffrischungsimpfung HBV bzw. Nachholen der HBV-Grundimmunisierung (spätestens bis zum 13. Lebensjahr) |    |    |     |     |     |                                  |     |     |     |     |
| Diphtherie (dip), Tetanus (TET),<br>Pertussis (PEA)     |  |    |    |     |     |     | Auffrischungsimpfung dip-TET-PEA |     |     |     |     |
| Masern, Mumps, Röteln (MMR)                             | Ev. MMR nachholen  |    |    |     |     |     |                                  |     |     |     |     |
| FSME  | FSME Auffrischung alle 5 Jahre   |    |    |     |     |     |                                  |     |     |     |     |
| Influenza (FLU)   | FLU-Impfung jährlich   |    |    |     |     |     |                                  |     |     |     |     |
| Humane Papillomaviren (HPV)                             | 3 x HPV (möglichst vor Eintritt in das sexuell aktive Alter)   |    |    |     |     |     |                                  |     |     |     |     |
| Varizellen (VZV)  | 2 x VZV bei negativer Varizellenanamnese   |    |    |     |     |     |                                  |     |     |     |     |
| Hepatitis A   | Hepatitis A - Impfung  |    |    |     |     |     |                                  |     |     |     |     |
| Meningokokken C   | Meningokokken C - Impfung  |    |    |     |     |     |                                  |     |     |     |     |

\*) dip=Diphtherie-Toxoidimpfstoff mit verringerter Antigenmenge

# Impfplan 2008

Österreich



Forum Impfschutz

**Mehrkosten pro Kind bei Inanspruchnahme aller empfohlenen Impfungen bis zum 15. Lebensjahr (mit durchschnittlichem Apothekenverkaufspreis inkl. 20% MwSt., ohne Berücksichtigung von Impfkationen)**

| Gratisimpfungen | Zusätzlich empfohlene Impfungen |                 |                |               |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                 |                                 | Preis pro Dosis |                | Impfhonorar   |
| 2x Rota         | Meningokokken 3x                | 56,85           | 170,55         | 30,00         |
| 4x 6-fach       | Pneumokokken 4x                 | 117,85          | 471,40         | 40,00         |
| 2xMMR           | FSME 6x                         | 26,85           | 161,10         | 60,00         |
| dT-IPV          | HepA 2x                         | 39,50           | 79,00          | 20,00         |
| dT-Pert         | HPV 3x                          | 208,00          | 624,00         | 30,00         |
| HBV             | Influenza 16x                   | 19,00           | 304,00         | 160,00        |
|                 | VZV 2x                          | 71,10           | 142,20         | 20,00         |
|                 |                                 |                 | <b>1952,25</b> | <b>360,00</b> |

## Erwachsene

### Allgemein empfohlene Impfungen im Erwachsenenalter

diese Empfehlungen gelten, sofern abgeschlossene Grundimmunisierung vorliegen

|   | 25 J.                            | 35 J.                       | 45 J.                       | 50 J. | 55 J.                       | 60 J.                            | 65 J.                       | 70 J.                       | 75 J. usw.                  |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FSME  | FSME - Auffrischung alle 5 Jahre |                             |                             |       |                             | FSME - Auffrischung alle 3 Jahre |                             |                             |                             |
| Diphtherie (dip)<br>Tetanus (TET)<br>Pertussis (PEA)<br>Poliomyelitis (IPV) | dip,<br>TET,<br>PEA,<br>IPV      | dip,<br>TET,<br>PEA,<br>IPV | dip,<br>TET,<br>PEA,<br>IPV |       | dip,<br>TET,<br>PEA,<br>IPV | dip,<br>TET,<br>PEA,<br>IPV      | dip,<br>TET,<br>PEA,<br>IPV | dip,<br>TET,<br>PEA,<br>IPV | dip,<br>TET,<br>PEA,<br>IPV |
| Influenza (FLU)   |                                  |                             |                             |       |                             | FLU Impfung - Jährlich           |                             |                             |                             |
| Herpes zoster   |                                  |                             |                             |       |                             | 1 x Herpes zoster                |                             |                             |                             |
| Pneumokokken (PNE)  |                                  |                             |                             |       |                             | PNE                              | PNE*)                       | PNE*)                       | PNE*)                       |

\*) Bei entsprechendem Risiko (Grundkrankheiten, bisherige Erkrankungen, besondere Exposition etc.)

- Grün: voll finanziert
- Gelb: teilweise finanziert
- Rot: nicht finanziert